



TRATAMIENTOS COVID-19



MEDICAMENTOS ORALES

PAXLOVID

QUIÉN DEBE USARLO:

Personas mayores de 12 años, que son positivas al COVID, que no están hospitalizadas y que tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente.

CÓMO SE UTILIZA:

Las personas que tomen Paxlovid tendrán que tomar 3 pastillas dos veces al día, durante 5 días.

BENEFICIOS:

Paxlovid reduce la posibilidad de hospitalización y muerte por COVID en un 88% y puede tomarse en casa.

MOLNUIPIRAVIR

QUIÉN DEBE USARLO:


Personas de 18 años o más, que son positivas al COVID, que no están hospitalizadas y que tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente.

CÓMO SE UTILIZA:

Las personas que tomen Molnupiravir tendrán que tomar 4 pastillas, dos veces al día, por 5 días.

BENEFICIOS:

Molnupiravir reduce la posibilidad de hospitalización y muerte por COVID en un 30% y puede tomarse en casa.



MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS

REMDESIVIR

QUIÉN DEBE USARLO:

Personas de 12 años o más que estén hospitalizadas con COVID o que no estén hospitalizadas pero que tengan un alto riesgo de enfermarse mucho por COVID.

CÓMO SE UTILIZA:

Las personas que utilicen Remdesivir deberán recibir infusiones de 1 a 2 horas durante 3 días. Estas infusiones se realizarán en un entorno clínico, como un hospital.

BENEFICIOS:

Remdesivir reduce la posibilidad de hospitalización y muerte por COVID en un 87%.

SOTROVIMAB

QUIÉN DEBE USARLO:

Personas mayores de 12 años, que son positivas al COVID, que no están hospitalizadas y que tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente.

CÓMO SE UTILIZA:

Las personas que utilicen Sotrovimab deberán recibir una infusión de 30 minutos cada día. Estas infusiones se realizarán en un entorno clínico, como un hospital.

BENEFICIOS:

Sotrovimab reduce la posibilidad de hospitalización y muerte por COVID en un 85%.

Todos los tratamientos de COVID-19 requieren la remisión de un proveedor médico. Si no tiene un proveedor de servicios médicos, llame a la línea de atención de coronavirus al: 1-855-600-3453